

## Fillersbehandling – information

### Före behandling – information

Informera läkaren om längre historik av munsår samt andra hudsjukdomar. Informera även om ev. medicinering, graviditet, amning, kända överkänsligheter, benägenhet för att utveckla misspyrdande ärr m m.

Informera även angående tidigare behandlingar samt hudtillstånd som kan påverka den befintliga behandlingen.

Informera oss om du äter blodförtunnande medicin.

Innan behandlingen rekommenderar vi att man undviker att använda mediciner som innehåller acetylsalicylsyra samt antiinflammatoriska ämnen – ett par dagar innan behandlingen – eftersom dessa mediciner kan ge ökad risk för mindre blödningar och blåmärken i samband med injektionen.

Dessa kan kvarstå 7-10 dagar och går över av sig själva.

### Under behandling – information

De fillers-produkter som används hos Doctor RY är en steril, homogen gel som består av icke-animalisk Hyaluronsyra.

Gelen injiceras i huden för att korrigera linjer, rynkor och veck i ansiktet samt skulpturerar läpparna och formar ansiktskonturer.

Behandlingsresultatet är omedelbart och håller sig allt beroende av produkt, 6-12 månader.

### Efter behandling – rekommendation

Rodnad, svullnad, blåmärken samt ömhet vid implantatstället. Dessa är normalt lätta till måttliga och försvinner vanligtvis spontant några dagar efter injektionen.

Lokala allergiska reaktioner är mycket sällsynta och består mest av svullnad och fasthet vid implantatstället. De är vanligtvis lätta till måttliga och självbegränsande och varar vanligtvis i ett par veckor. I ytterst sällsynta fall upp till ett par månader.

Om det inom de närmaste timmarna (upp till ett par dagar) efter behandlingen uppstår någon ovanlig reaktion i form av missfärgning, extrem rodnad, svullnad, irritation eller varbölder i de injicerade områdena och områdena runt omkring, kontakta kliniken.

*Uppföljningsbehandling hjälper till att bibehålla önskad korrigerings.*